

[1] 地上からボールを地表面とのなす角度 θ で投げ上げた。このときのボールの最高点の高度を力学的エネルギー保存則を用いて求めよ。

[2] 空気の抵抗力 $-m\gamma v$ を受けながら落下運動する質量 m の質点がある。この質点が静かに落下し始めてから時間 T だけたったとき、失われた 力学的エネルギーはいくらか。運動は 1 次元のみでおこるものとせよ。

[3] 力 (保存力) のベクトルは、等ポテンシャル面と直交することを示せ。

[4] 次のスカラーポテンシャルの勾配を計算することにより、保存力 \mathbf{F} を求めよ。(ただし、以下では $r = (x^2 + y^2 + z^2)^{1/2}$ とする。)

(a) $U(r) = -GmM/r$ 、 (b) $U(r) = \frac{1}{2}kr^2$

[5] 距離 r だけ離れた、質量 m と M の物体間に働く万有引力は

$$\mathbf{F} = -G \frac{mM}{r^3} \mathbf{r}$$

で与えられる。この力が保存力であることを示せ。演習問題 (1 4) の [2] を利用せよ。

[6] 減衰振動の方程式

$$m\ddot{x} = -m\omega^2 x - 2m\gamma\dot{x}$$

を考える。 $\omega \gg \gamma$ を満たす減衰が弱い場合に、力学的エネルギーがどのように散逸していくかを調べよう。

(1) 解が近似的に、 $x(t) = x_0 e^{-\gamma t} \cos(\omega t + \alpha)$ となることを示せ。なお以下では簡単のため、 $t = 0$ で変位 x_0 から振動が開始したとし、 $\alpha = 0$ とせよ。

(2) 力学的エネルギーの一周期にわたる平均 \bar{E} が、 $\bar{E} = E_0 e^{-2\gamma t}$ (E_0 はエネルギーの初期値。) となることを示せ。ただし減衰が弱い場合、一周期の間には振幅がほとんど変化しないことを考慮し、 $e^{-2\gamma t}$ を時間平均の外に出して計算せよ。